

Зил Т, маз

Хомеопатичен лекарствен продукт

Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:

1. Какво представлява Зил Т и за какво се използва
2. Преди да използвате Зил Т
3. Как да използвате Зил Т
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Зил Т
6. Допълнителна информация

1. Какво представлява Зил Т и за какво се използва

Хомеопатичен лекарствен продукт.

Използва се при артроза /особено гонартроза/, полиартроза, спондилартроза, хумероскапуларен периартрит.

2. Преди да приемете Зил Т

Не използвайте Зил Т ако имате свръхчувствителност към арника, отровен бръшлян и/или към някоя от другите съставки на лекарствения продукт.

Употреба на други лекарства - не са известни лекарствени взаимодействия.

Употреба на Зил Т с храни и напитки - няма несъвместимости.

Бременност и кърмене - посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство. Да не се използва по време на бременност и кърмене.

Шофиране и работа с машини - Зил Т не повлиява концентрацията и няма неблагоприятен ефект върху шофирането и работата с машини

3. Как да приемете Зил Т

Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт. Ако няма друго предписание, се нанася върху засегнатите места сутрин и вечер, напр. в областта на колянната става се взрива от маза лента с дължина 4-5 см.

Употреба при деца - не е противопоказан.

Ако сте използвали повече от обичайната доза - Зил Т няма доза на предозиране.

Ако сте пропуснали да използвате Зил Т - продължете по указаната схема.

Ако сте спрели употребата на Зил Т - Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Ако симптомите продължат или състоянието се влоши да се направи консултация с лекар.

4. Възможни нежелани реакции

Цетилстеарилалкохол може да предизвика локални кожни реакции (контактен дерматит). В много редки случаи може да предизвика реакция на свръхчувствителност и/или алергична кожна реакция.

5. Как да съхранявате Зил Т

Без специални условия на съхранение.

Продуктът да се съхранява на място далече от погледа и досега на деца!

Срок на годност - 3 години.

Срок на годност след отваряне на тубата - 12 месеца.

Да не се използва след изтичането на срока на годност, отбелязан върху опаковката!

Лекарствата трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Допълнителни информация

Какво съдържа Зил Т:

100 g съдържат:

Активни вещества:

Cartilago suis D2 - 0,001 g;

Funiculus umbilicalis suis D2 - 0,001 g;

Embryo suis D2 - 0,001 g;

Placenta suis D2 - 0,001 g;

Rhus toxicodendron D2 - 0,27 g;

Arnica montana D2 - 0,3 g;

Solanum dulcamara D2 - 0,075 g;

Symphytum D8 - 0,75 g;

Sanguinaria canadensis D2 - 0,225 g;

Sulfur D6 - 0,27 g;

Nadidum D6 - 0,01 g;

Coenzym A D6 - 0,01 g;

Acidum alpha-liponicum D6 - 0,01 g;

Natrium diethylalaceticum D6 - 0,01 g;

Acidum silicicum D6 - 1 g.

Помощни вещества:

Етанол 96% - 9,565 g;

Пречистена вода - 60,810 g;

Емулгиращ цетилстеарил алкохол (тип А) - 8,007 g;

Парафин, течен - 9,342 g;

Бял мек парафин - 9,342 g;

Консервиращо вещество: 12,8 об.% алкохол.

Как изглежда и какво съдържа опаковката:

Туба, съдържаща 50 g маз / картонена кутия.

Притежател на разрешението за употреба и производител:

Biologische Heilmittel Heel GmbH, Германия

Дата на последно одобрение на листовката: 03.2011